


# Un terç dels boscos mundials experimentaran estrès pel canvi climàtic

## Un estudi internacional on participa la UdL analitza la variació global del tipus de fulla

Fins a un terç de les zones boscoses de la Terra poden experimentar estrès climàtic a finals de segle. Així ho assenyalava un estudi internacional en què ha pres part el professor de la Universitat de Lleida (UdL) i investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestals de Catalunya (CTFC) i de la unitat conjunta CTFC-Agrotecnio, Sergio de Miguel. Per primer cop, científics i científiques d'arreu del món han cartografiat globalment els tipus de fulla i la quantitat de biomassa forestal aèria emmagatzemada a cadascun. La recerca, liderada per l'Institut Federal Suís de Tecnologia, l'acaben de publicar a la revista *Nature Plants* [ <https://www.nature.com/nplants/> ].



En el treball ha participat personal investigador d'una cinquantena de països de tots els continents, des dels Estats Units a Sud-àfrica, el Japó, Costa Rica o Nova Zelanda. L'equip ha determinat que el grup més nombrós d'arbres és el de fulles **perennes** [ <https://ca.wikipedia.org/wiki/Perenne> ] (que es conserven tot l'any) i aciculars (en forma d'agulla), amb un 38%. Les densitats més grans d'aquest es troben a les regions boreals i subàrtiques. Després trobem els arbres de fulles perennes frondoses (fulla ampla), amb un 29%; les frondoses **caducifòlies** [ <https://ca.wikipedia.org/wiki/Caducifoli> ] (que es desprenen durant les estacions desfavorables), amb un 27%; i els arbres amb acícules de fulla caduca, amb un 5%.

Les investigacions mostren que els arbres frondosos de fulla perenne són els que aporten més biomassa forestal aèria mundial, amb un 54% del total, 335,7 giga-tones de carboni (Gt C). Encara que hi ha molts més arbres de fulla acicular perenne que de fulla ampla; en comparació, els de fulla en forma d'agulla només emmagatzemen el 21% de la biomassa forestal aèria mundial (136,4 Gt C).

"En quantificar la distribució dels tipus de fulles d'arbres i la seua biomassa corresponent, identificant alhora les regions on el canvi climàtic exercirà una pressió més gran sobre els boscos actuals, els nostres resultats poden ajudar a millorar les prediccions del funcionament futur dels ecosistemes terrestres i el cicle del carboni", conclouen.

**Text: Comunicació CTFC / Premsa UdL**

**M É S**

**I N F O R M A C I Ó :**

Article *The global biogeography of tree leaf form and habit* [ <https://www.nature.com/articles/s41477-023-01543-5> ]

Notícia del CTFC: Les fulles ajuden a veure el bosc [ <https://blog.ctfc.cat/ca/les-fulles-ajuden-a-veure-el-bosc/> ]

